

**Aufgaben und Ergebnisse der Klausur am 12. 2. 2019**

für Studierende des Verkehrsingenieurwesens zum Modul  
Lineare Algebra und Analysis für Funktionen einer Variablen

**Alle Angaben ohne Gewähr!**

1. a) Gegeben seien eine reelle Zahl  $\alpha$  und die komplexe Zahl  $w_1(\alpha) := 1 + \alpha i$ . Bestimmen Sie den Betrag  $r(\alpha)$  dieser komplexen Zahl sowie den Realteil von  $w_2(\alpha) := \frac{1}{w_1(\alpha)}$ . 2

- b) Gegeben sei das Polynom  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  durch  $p(z) := z^4 + 8iz$ . Bestimmen Sie alle Nullstellen dieses Polynoms in  $\mathbb{C}$ . 3

2. Gegeben sei die injektive Funktion  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$f(x) := \frac{x+1}{x-1},$$

wobei  $D_f \subset \mathbb{R}$  den größtmöglichen Definitionsbereich von  $f$  und  $W_f := f(D_f)$  den Wertebereich von  $f$  bezeichnet.

- a) Geben Sie  $D_f$  an. 1

- b) Zeigen Sie, dass  $f : (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$  injektiv ist. 1

- c) Bestimmen Sie  $W_f$ . 2

- d) Für die Funktion  $g : W_f \rightarrow \mathbb{R}$  gelte  $g(f(x)) = x$  für alle  $x \in D_f$ . Ermitteln Sie eine explizite Vorschrift für  $g(y)$ . 2

3. a) Ermitteln Sie den Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{e^x - 1}$ . 1

- b) Für  $a \in \mathbb{R}$  sei die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben durch 1

$$f(x) := \begin{cases} 1 - \cos(x - \pi), & \text{für } x < \pi, \\ a + 2(x - \pi)^2, & \text{für } x \geq \pi. \end{cases}$$

Ermitteln Sie, für welche Werte  $a$  die Funktion  $f$  stetig ist.

- c) Ermitteln Sie ein Polynom  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  zweiten Grades, das den Bedingungen 3

$$p(-1) = 1, \quad p(0) = 2, \quad p(1) = 5$$

genügt. Bestimmen Sie außerdem ein Polynom  $q$  dritten Grades, das diese Bedingungen und die Forderung  $q(2) = 4$  erfüllt.

- d) Für eine Funktion  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei bekannt, dass es eine Umgebung von  $x = 0$  gibt, so dass  $h$  in dieser Umgebung differenzierbar ist und die Gleichung 3

$$(h(x))^3 + 3h(x) + x^3 + 7x = 0$$

erfüllt. Ermitteln Sie  $h(0)$  und  $h'(0)$ .

4. Gegeben sei die Funktion  $f : (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) := \ln(x - 2)$ . Weiter bezeichne  $T_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  das quadratische Taylorpolynom zur Funktion  $f$  für die Entwicklungsstelle  $x_0 := 3$ .

a) Ermitteln Sie  $T_2$ . 2

b) Geben Sie das Restglied  $R_2 : (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  (etwa in der Lagrange-Form) an, so dass also  $f(x) = T_2(x) + R_2(x)$  für alle  $x \in (2, \infty)$  gilt. 1

c) Ermitteln Sie mit Hilfe des Restgliedes aus b) eine möglichst große Zahl  $\delta > 0$ , so dass  $|f(x) - T_2(x)| \leq \frac{1}{3}10^{-6}$  für alle  $x \in [3, 3 + \delta]$  gilt. 2

5. a) Ermitteln Sie das unbestimmten Integral  $\int x^3 \cos(x^2) dx$ . 3

b) Die gebrochen rationale Funktion  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  sei gegeben durch 3

$$f(x) := \frac{x^3}{(x^2 - 2x + 1)(x^2 + 1)}.$$

Geben Sie einen Ansatz für die Partialbruchzerlegung von  $f$  an.

c) Gegeben sei die Funktion  $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $g(x) := \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$ .  
Zeigen Sie, dass  $g$  streng monoton wachsend ist. 2

d) Gegeben sei die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) := \cos(3x) \cos(x)$ .  
Bestimmen Sie durch partielle Integration eine Stammfunktion von  $f$ . 2

6. Für reelle Parameter  $\alpha, \beta$  seien die Matrix  $\mathbf{A}$  und der Vektor  $\mathbf{b}$  gegeben durch

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & \alpha & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b} := \begin{pmatrix} \beta \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Ermitteln Sie jeweils alle Paare  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , so dass das Gleichungssystem  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$   
a1) eine eindeutige Lösung, a2) unendlich viele Lösungen, a3) keine Lösung besitzt. 4

b) Berechnen Sie für  $\alpha = 0$  und  $\beta = -1$  die Ausdrücke  $\mathbf{A} + \mathbf{b}^\top \mathbf{b}$  bzw.  $\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{b}^\top$ , sofern das möglich ist. 1

7. a) Weisen Sie nach, dass die Vektoren 3

$$\mathbf{v}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

eine Basis des  $\mathbb{R}^3$  bilden. Verändern Sie genau eine Koordinate des Vektors  $\mathbf{v}_1$  so, dass die drei Vektoren linear abhängig werden.

b) Der Vektorraum  $\mathbb{R}^n$  sei mit dem Standardskalarprodukt ausgestattet. Weiter seien  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  und  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  Vektoren, die beide den Betrag 1 besitzen und zueinander senkrecht sind. Ermitteln Sie den Betrag des Vektors  $4\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$ . 2