

Aufgaben zur Vorlesung Mathematik I/2

2. Woche – Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen mehrerer Variablen

Denken in 3D – Schnittlinien

Ü2 Aufgabe 17.1.

Gesucht sind alle Punkte $P(x; y; z)$ des \mathbb{R}^3 , für welche gilt:

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $y = 14$, | b) $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 0$, |
| c) $zx = 1$, | d) $z + y = 0$, |
| e) $(x + 5)^2 + z^2 = 8$, | f) $ x + y + z = 1$, |
| g) $19 + \sqrt{(x - 6)^2 + y^2} - 81 \geq 0$, | h) $\max\{x^2, y^2, z^2\} \leq 4$. |

(Geometrische Interpretation!)

Ü2 Aufgabe 17.2.

Skizzieren Sie die folgenden Flächen! Überlegen Sie vorher, welche Kurven sich ergeben, wenn die Flächen mit Ebenen $x = \text{const}$, $y = \text{const}$, $z = \text{const}$ geschnitten werden.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a) $x^2 + z^2 = 9$, | b) $z^2 + 9x^2 + 4y^2 = 1$, |
| c) $y^2 = x^2 + z^2$, | d) $z^2 - 4x^2 + y^2 = 1$, |
| e) $z^2 = x^2 + y^2 + 1$, | f) $z = x^2 + 1 - y^2$, |

Ü2 Aufgabe 17.3.

Von der Funktion $z = f(x, y)$ sind die Niveaulinien zu bestimmen. von der in der x, y -Ebene skizzierten zugehörigen „Karte der Fläche“ schließe man auf die Gestalt der durch f bestimmten Fläche F im \mathbb{R}^3 .

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| a) $z = x - 6$, | b) $z = \sqrt{1 - y^2}, y \leq 1$, | c) $z = x^2 - y^2 + 4$, |
| d) $z = 10 - \sqrt{x^2 + y^2}$, | e) $z = x^2 + (y + 2)^2 - 4$, | |
| f) $z = (x + 1)(y - 3)$, | g) $z = 3 - 4x^2 - 9y^2$, | |

Ü2 Aufgabe 17.6.

Skizzieren Sie den größtmöglichen Definitionsbereich von $z = f(x, y)$!

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) $z = \ln(x^2 - y^2)$, | b) $z = \sqrt{x^2 + 3y^2 - 9} - \frac{1}{xy}$, | c) $z = \frac{\ln(y - x)}{\sqrt{y - \sqrt{x}}}$, |
| e) $z = \arcsin(5 - 2y + 2x)$, | | |

Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen mehrerer Variablen

Ü2 Aufgabe 17.7.

Man bestimme $\lim_{P \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, wenn sich P längs

$\alpha)$ der x -Achse; $\beta)$ der y -Achse; $\gamma)$ der Geraden $y = tx$, $t = \text{const}$, bewegt.

Läßt sich aus den erhaltenen Ergebnissen etwas über die Existenz von $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ folgern?

a) $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2}$,

b) $f(x, y) = \frac{y^2 \sin 2x}{x^2 + 4}$,

c) $f(x, y) = \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2}$.

Ü2 Aufgabe 17.8.

Die folgenden Grenzwerte sind - falls sie existieren - zu berechnen.

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin 8xy}{2xy}$,

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,3)} \frac{x-3}{x-y}$,

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$,

Ü2 Aufgabe 17.9.

Welche der Funktionen $z = f(x, y)$ sind im Ursprung stetig?

a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy(y^2 - x^2)}{x^2 + y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$,