

## Übungen zur Vorlesung Mathematik II/2 (inkl. Kurzlösung)

### 11. Woche – PDGL erster Ordnung + Charakteristiken-Methode

**A1** Geben Sie je ein Beispiel an:

- (a) eine PDGL zweiter Ordnung,
- (b) eine PDGL zweiter Ordnung, die keine gewöhnliche DGL ist,
- (c) eine lineare PDGL,
- (d) eine lineare PDGL mit konstanten / nicht-konstanten Koeffizienten,
- (e) eine quasilineare PDGL,
- (f) eine nichtlineare PDGL, die keine quasilineare PDGL ist.

**Lineare PDGL erster Ordnung: Transformation nach Methode 2, s. Bem. 15.3 <sup>1</sup>**

**A2** Man bestimme die allgemeinen Lösungen folgender partieller Differentialgleichungen:

- (a)  $\frac{z_x}{\cos x} + \frac{z_y}{\cos y} = 1$ ,
- (b)  $xyz_x - y^2z_y = x$ ,

Zusatz:  $y u_x - x u_y = 0$ .

**Kurzlösung:**

- (a) z.B.  $\xi = \sin x - \sin y, \eta = \sin x, \dots u = \sin x + C(\sin x - \sin y)$ ,
- (b) z.B.  $\xi = x \cdot y, \eta = x, \dots z = \frac{x}{2y} + C(x \cdot y)$ ,

Zusatz: z.B.  $\xi = x^2 + y^2, \eta = x, \dots u = C(x^2 + y^2)$ .

### Homogene PDGL erster Ordnung ohne Randbedingungen

**A3** Im Fach Nichtlineare Regelungstechnik 1 muss zur Aufstellung einer bestimmten Normalform von Zustandsdarstellungen (konkret der Byrnes-Isidori-Normalform) eine PDGL folgender Art gelöst werden

$$\text{grad } u(x, y) \cdot \underline{g}(x, y) = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} \cdot \underline{g}(x, y) = 0 \text{ bzw. } \text{grad } u(x, y, z) \cdot \underline{g}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \cdot \underline{g}(x, y, z) = 0 \quad (*)$$

Bestimmen Sie für die folgenden Beispiele zunächst die allgemeine Lösung der PDGL (\*) und überprüfen dann, ob die angegebene spezielle Lösung in Ihrer allgemeinen Lösung enthalten ist:

- (a)  $\underline{g}(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  also ist die allgemeine Lösung von  $u_x \cdot 0 + u_y \cdot 1 = 0$  gesucht. Eine spezielle Lösung ist  $u(x, y) = x$ .

<sup>1</sup>Sie werden die sogenannte Charakteristiken-Methode u.a. in der Vertiefung AMR in der LV Verteilparametrische Systeme wieder brauchen. Wir hoffen, dass Sie sich dann noch daran erinnern können :-).

(b)  $\underline{g}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ; spezielle Lösung  $u(x, y, z) = y$ .

(c)  $\underline{g}(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{2+z^2}{1+z^2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ; spezielle Lösung  $u(x, y, z) = -x + z + \arctan(z)$ .

(d) Hier  $u = u(x, y, z, t)$ :  $\underline{g}(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \cos(z) \end{pmatrix}$ ; eine spezielle Lösung ist  $u(x, y, y, t) = x$ ;  
noch eine spezielle Lösung ist  $u(x, y, z, t) = -y \cos(z) + t$ .

**Kurzlösung:**

(c) Z.B.  $u(x, y, z) = C(y, -x + z + \arctan(z))$  s. auch [NL1 VL7 Folie 23](#).

### Homogene PDGL erster Ordnung mit Randbedingungen

**A4** Man bestimme die allgemeine Lösungsfläche  $z(x, y)$  der partiellen Differentialgleichung

$$z_x + z_y = 0,$$

die die Randbedingung  $z(x, 0) = x$  erfüllt.

Führen Sie die Probe aus, ob Ihre Lösung die PDGL und die Randbedingung erfüllt.

**A5** Man bestimme diejenige Lösungsfläche  $z(x, y)$  der folgenden partiellen Differentialgleichung, die im Gebiet  $\Omega : x, y > 0$  die angegebene Randbedingung erfüllt:

$$xz_x - yz_y = 0, \quad RB : \quad z(x, x) = x.$$

Überprüfen Sie, ob Ihre Lösung die PDGL und die Randbedingung erfüllt.

Zeichnen Sie einige Charakteristiken, das sind Kurven mit  $\xi = \text{konstant}$ , in die  $x, y$ -Ebene. Auf diesen Kurven wäre die Lösung der Rumpf-PDGL konstant, s. [Bem. 15.3](#), jedoch im Allgemeinen nicht die Lösung der PDGL - hier schon, da PDGL = Rumpf-PDGL.

Markieren Sie in der  $x, y$ -Ebene die Kurve, auf der die 'Rand'bedingung vorgegeben ist.

Schneidet diese Kurve jede Charakteristik in genau einem Punkt, erfüllt also [Bem. 15.5](#) ?

**Kurzlösung:**  $z(x, y) = (x \cdot y)^{\frac{1}{2}}$ .

### Quasilineare PDGL erster Ordnung mit Randbedingungen

**A6** Gegeben sei die partielle Differentialgleichung  $-x z_x + y z_y = x z^2$ .

(a) Man ermittle die allgemeine Lösung dieser partiellen Differentialgleichung.

(b) Man ermittle die spezielle Lösung  $z = z(x, y)$  für die Anfangsbedingung  $z(x, 1) = e^{-x}$ .

**Kurzlösung:**  $z(x, y) = \frac{1}{x + e^{xy} - xy}$ .